

МРТ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ, ЛОКАЛЬНОЕ СТАДИРОВАНИЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ: ПЕРВИЧНОЕ / Повторное, сравнение с исследованием от ____ г.

Указать силу магнитного поля, использованные катушки, вид и доза внутривенного контраста

Указать импульсные последовательности.

Результаты:

Морфология опухоли: Солидная, полиповидная, изъязвленная, полулунная, плоская, муцинозная

Локализация опухоли:

Циркумференциальное поражение опухолью: от [] до [] часов (по условному циферблату)

Расстояние от аноректального перехода до нижнего полюса опухоли: [] см

Отношение к передней части брюшины: [ниже/выше/пересекает]

Длина опухоли: [] см

Местная инвазия (Т-стадия):

- Инфильтрация подслизистой (Т1)
- Инфильтрация мышечной оболочки (Т2)
- Расстояние между внешним краем собственной мышечной оболочки и максимальным экстрамуральным распространением опухоли <1,00 мм (Т3а)
- Расстояние между наружным краем собственной мышечной оболочки и максимальным экстрамуральным распространением опухоли 1,01-5,00 мм (Т3б)
- Расстояние между наружным краем собственной мышечной оболочки и максимальным экстрамуральным распространением опухоли 5,01-15,00 мм (Т3с)
- Расстояние между наружным краем собственной мышечной оболочки и максимальным экстрамуральным распространением опухоли >15,01 мм (Т3д)
- Инфильтрация соседних органов (Т4а)
- Инвазия висцеральной брюшины (Т4б)

Инвазия анального сфинктера: [нет/да, только внутренний сфинктер/да, внутренний сфинктер + межсфинктерная пространство/да, внутренний + наружный сфинктер].

Если да, то самая нижняя часть инвазии достигает [верхней/средней/дистальной] трети анального канала

Вовлечение мезоректальной фасции (МРФ):

Наименьшее расстояние между опухолью и МРФ: [] мм, что указывает на [свободный (> 2 мм) / вовлеченный (≤ 2 мм)] край

Круговое расположение кратчайшего расстояния между опухолью и МРТ: [] часов

Лимфатические узлы и опухолевые очаги:

Общее количество лимфатических узлов: []

Общее количество подозрительных лимфатических узлов: [], из них [] внутри мезоректальной, [] экстрамезоректальных

Необязательно включать в отчет:

- [] узлы с короткой осью ≥ 9 мм
- [] узлы с короткой осью 5-8 мм и как минимум 2 морфологически подозрительных узлов
- [] узлы с короткой осью 5 мм и все 3 морфологически подозрительных узлов
- [] муцинозные узлы (любого размера)

N-стадия: [N0/N+]

Количество опухолевых очагов в мезоректуме: []

Наличие экстрамуральной сосудистой инвазии (ЭМСИ): [да/нет]

Заключение: